



О проведении иммунизации против кори трудовых мигрантов на территории Российской Федерации

В целях создания устойчивого коллективного иммунитета к кори для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения по кори на территории Российской Федерации п. 3 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 08.02.2023 № 1 «О проведении подчищающей иммунизации против кори на территории Российской Федерации» на работодателей, привлекающих к трудовой деятельности иностранных граждан, возложена обязанность обеспечить проведение иммунизации против кори привлеченных и привлекаемых трудовых мигрантов, не болевших корью и не имеющих прививок или сведений о прививках против кори. Иммунизацию трудовых мигрантов против кори необходимо провести до 31 декабря 2023 года.



Россия Федерацияси ҳудудида меҳнат муҳожирларини қизамиқга қарши эмлаш ҳақида

Россия Федерацияси ҳудудида қизамиқга қарши барқарор жамоавий иммунитетни ташкиллаш, аҳолининг қизамиқ бўйича санитария-эпидемиологик фаровонлигини тامينлаш мақсадида, Давлат бош санитар шифокорининг 08.02.2023 йилдаги «Россия Федерацияси ҳудудида қизамиқга қарши тозалаш иммунизациясини олиб бориш ҳақида» ги 1-сонли қарорининг 3-моддасига асосан, чет эл фуқароларини ишга жалб этадиган иш берувчиларни зиммасига ишга жалб қилинаётган ва ишга жалб қилинган қизамиқдан касал бўлмаган ва қизамиқга қарши эмланганлиги ҳақида маълумоти бўлмаган чет эл фуқароларнинг қизамиқга қарши эмланишини тامينлаш вазифаси юклатилди. Меҳнат муҳожирларини қизамиқга қарши эмлашни 31 декабр 2023 йилгача амалга оширилиши керак.



Дар бораи гузаронидани эмкунӣ бар зидди бемории сурхча муҳоҷирони меҳнатӣ дар қаламрави Федератсияи Русия

Бо мақсади ба вучуд овардани иммунитетни устувори галаи зидди сурхча барои таъмини некӯаҳволии санитарияу эпидемиологии аҳоли дар робита ба бемории сурхча дар қаламрави Федератсияи Россия, банди 3 бо Фармони Сардухтури давлатии санитарии Федератсияи Россия аз 08.02.2023 № 1 «Дар бораи гузаронидани эмкунии бар зидди сурхча дар қаламрави Федератсияи Русия» корфармоёне, ки шаҳрвандони хориҷиро ба кор мегиранд, вазифадоранд эмгузарониро бар зидди сурхча муҳоҷирони меҳнати чалбшударо, ки ба бемории сурхча гирифтаанд ва вакцина ё маълумот надоранд, вакцинаҳо бар зидди сурхча таъмин намоянд. Иммунизатсияи муҳоҷирони корӣ аз бемории сурхак бояд то 31 декабри соли 2023 анҷом дода шавад.



Памятка пациента

о проведении вакцинации против КОРИ

- Вакцинация от кори считается единственным профилактическим мероприятием.
- Ослабленный вирус не опасен для здоровья, он поможет организму выработать иммунитет к болезни.
- Для принятия решения о необходимости противокоревой вакцинации, еще до прививки **можно сделать анализ на титр антител к кори**. При определении в крови специфических антител прямых показаний для прививания организма нет.

➔ Подготовка к прививке против кори:

1. Врачебный осмотр перед прививкой от кори с измерением температуры тела и исключением наличия симптомов ОРВИ.
2. Предупреждение переохлаждений перед вакцинацией, отказ от аллергенных продуктов, алкоголя.

➔ Правила поведения после прививки включают несколько моментов:

1. Ограничение контакта с больными людьми.
2. В процессе принятия душа или водных процедур важно следить за местом укола и не растирать его мочалкой.
3. В течение трех дней после прививки не следует вводить в рацион питания продукты, отличающиеся повышенной аллергенностью.

➔ Возможные реакции организма на проведение вакцинации

Как и большинство других живых вакцин, прививка от кори способна вызывать развитие нежелательных эффектов. Такие последствия могут проявляться реакциями общего или местного типа.

К общим изменениям относятся повышение температуры тела, кашель, покраснение горла, насморк и тому подобное.

Местные нарушения возникают в зоне введения препарата и принимают вид покраснения кожи, отека на месте инъекции, которые самостоятельно проходят спустя несколько дней.

➔ Противопоказания к проведению вакцинации:

- беременность;
- первичный иммунодефицит;
- приобретенный иммунодефицит (СПИД);
- наличие тяжелых осложнений при предыдущей прививке;
- наличие аллергии на аминокликозиды, куриный белок;
- новообразование (злокачественное);
- вакцинацию переносят на 3 месяца в случае введения иммуноглобулина, препаратов крови.